
FICHE 2 : PROBABILITÉS CONDITIONNELLES ET INDÉPENDANCE

Exercice 1

Une urne contient 10 jetons jaunes, 5 blancs et 1 rouge. J'ai tiré un jeton de cette urne et je vous annonce qu'il n'est pas rouge. Quelle est la probabilité qu'il soit jaune ?

Exercice 2

Un joueur de tennis a une probabilité de 40% de passer sa première balle de service. S'il échoue, sa probabilité de passer sa deuxième balle est 70%. Lorsque sa première balle de service passe, sa probabilité de gagner le point est 80%, tandis que sa probabilité de gagner le point lorsqu'il passe sa deuxième balle de service n'est plus que 50%. Calculer

- La probabilité qu'il passe sa deuxième balle et celle qu'il fasse une double faute.
- La probabilité qu'il perde le point sur son service.
- Sachant qu'il a perdu le point, quelle est la probabilité que ce soit sur une double faute ?

Exercice 3

On cherche une girafe qui, avec une probabilité $p/7$, se trouve dans l'un des quelconques des 7 étages d'un immeuble, et avec probabilité $1 - p$ hors de l'immeuble. On a exploré en vain les 6 premiers étages.

- Quelle est la probabilité qu'elle habite au septième étage ? On note $f(p)$ cette probabilité.
- Représenter la fonction $p \mapsto f(p)$

Exercice 4

Un test permet de dépister si une pièce est défectueuse. Il n'est cependant pas fiable absolument. Ce test donne pour pièce défectueuse une pièce défectueuse dans 95% des cas et une pièce non défectueuse pour une pièce saine dans 90% des cas. Un lot de pièces contient 8% de pièces défectueuses. On prend une des pièces du lot au hasard : la pièce choisie est testée et déclarée défectueuse. Quelle est la probabilité pour qu'elle le soit vraiment ?

Exercice 5

Un avion a disparu et la région où il s'est écrasé est divisée pour sa recherche en trois zones de même probabilité. Pour $i = 1, 2, 3$, notons $1 - \alpha_i$ la probabilité que l'avion soit retrouvé par une recherche dans la zone i s'il est effectivement dans cette zone. Les constantes α_i représentent les probabilités de manquer l'avion et sont généralement attribuables à l'environnement de la zone (relief, végétation,...). On notera A_i l'événement *l'avion est dans la zone i* , et R_i l'événement *l'avion est retrouvé dans la zone i* ($i = 1, 2, 3$).

- a) Pour $i = 1, 2, 3$, déterminer les probabilités que l'avion soit dans la zone i sachant que la recherche dans la zone 1 a été infructueuse.
- b) Étudier brièvement les variations de ces trois probabilités conditionnelles considérées comme fonctions de α_1 et commenter les résultats obtenus.

Exercice 6

On lance deux dés et on considère les événements :

$$A = \{\text{le résultat du premier dé est impair}\},$$

$$B = \{\text{le résultat du second dé est pair}\},$$

$$C = \{\text{les résultats des deux dés sont de même parité}\}.$$

Étudier l'indépendance deux à deux des événements A , B et C , puis l'indépendance mutuelle (indépendance de la famille) A, B, C .

Exercice 7

On s'intéresse à la répartition des sexes des enfants d'une famille de n enfants. On prend comme modélisation

$$\Omega_n = \{\mathbf{f}, \mathbf{g}\}^n = \{(x_1, \dots, x_n), x_i \in \{\mathbf{f}, \mathbf{g}\}, i = 1, \dots, n\},$$

muni de l'équiprobabilité. On considère les événements :

$$A = \{\text{la famille a des enfants des deux sexes}\} \quad B = \{\text{la famille a au plus une fille}\}.$$

- a) Montrer que pour $n \geq 2$, $P(A) = (2^n - 2)/2^n$ et $P(B) = (n + 1)/2^n$.
- b) En déduire que A et B ne sont indépendants que si $n = 3$.

Exercice 8

On effectue des lancers répétés d'une paire de dés discernables et on observe pour chaque lancer la *somme* des points indiqués par les deux dés. On se propose de calculer de deux façons la probabilité de l'événement E défini ainsi : *dans la suite des résultats observés, la première obtention d'un 9 a lieu avant la première obtention d'un 7.*

- a) Quelle est la probabilité de n'obtenir ni 7 ni 9 au cours d'un lancer ?
- b) *Première méthode* : On note $F_i = \{\text{obtention d'un 9 au } i\text{-ième lancer}\}$ et pour $n > 1$, $E_n = \{\text{ni 7 ni 9 ne sont obtenus au cours des } n - 1 \text{ premiers lancers et le } n\text{-ième lancer donne 9}\}$. Dans le cas particulier $n = 1$, on pose $E_1 = F_1$.
- Exprimer E à l'aide d'opérations ensemblistes sur les E_n ($n \geq 1$). Exprimer de même chaque E_n à l'aide des F_i et des $H_i = \{\text{ni 7 ni 9 au } i\text{-ième lancer}\}$.
 - Calculer $P(E_n)$ en utilisant l'indépendance des lancers.
 - Calculer $P(E)$.
- c) *Deuxième méthode* : On note $G_1 = \{\text{obtention d'un 7 au premier lancer}\}$.
- Donner une expression de $P(E)$ en utilisant le conditionnement par la partition $\{F_1, G_1, H_1\}$.
 - Donner sans calcul les valeurs de $P(E | F_1)$, $P(E | G_1)$ et expliquer pourquoi $P(E | H_1) = P(E)$.
 - En déduire la valeur de $P(E)$.